© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at

No. 5 u. 6. Mai-Juni 1895.

Nachrichtsblatt

der deutschen

Malakozoologischen Gesellschaft.

Siebenundzwanzigster Jahrgang.

Abonnementspreis: Mk. 6.— für den Jahrgang frei durch die Post im In- und Ausland. — Erscheint in der Regel monatlich.

Briefe wissenschaftlichen Inhalts, wie Manuskripte, Notizen u. s. w. gehen an die Redaktion: Herrn **Dr. W. Kobelt** in Schwanheim bei Frankfurt a. M.

Bestellungen (auch auf die früheren Jahrgänge des Nachrichtsblattes und der Jahrbücher vom Jahrgange 1881 ab), **Zahlungen** und dergleichen an die Verlagsbuchhandlung des Herrn **Moritz Diesterweg** in Frankfurt a. M. (Aeltere Jahrgänge des Nachrichtsblattes und der Jahrbücher bis 1880 inclusive sind durch die Buchhandlung von *R. Friedländer & Sohn in Berlin* zu beziehen).

Andere die Gesellschaft angehende **Mittheilungen**, Reklamationen, Beitrittserklärungen u. s. w. gehen an den Präsidenten: Herrn **D. F. Heynemann** in Frankfurt a. M. — Sachsenhausen.

Mittheilungen aus dem Gebiete der Malakozoologie.

Diagnoses

specierum novarum ex insulis Philippinis auctoribus J. F. Quadras et O. F. von Moellendorff.

(Fortsetzung.)

114. *Ennea (Diaphora) cylindrica* Quadr. et Mlldff.

T. rimata, cylindrico-turrita, tenuis, pellucida, alba, costulis confertis sculpta, sericina; spira sursum vix attenuata apice obtuso obliquo glabrato. Anfr. 9 planiusculi, infra suturam profundam subangulati, ultimus sat ascendens. Apertura fere verticalis rotundato-tetragona, peristoma continuum, superne solutum, profundiuscule sinuatum, modice expansum, labiatum, margine dextro superne subito attenuato. Lamella parietalis sat valida, alta, longe intrans, cum callo

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at

marginis externi sinulum circularem fere claudens, columellaris parvula a margine remota.

Alt. 4, 2, diam. vix 1 mm.

Hab. prope vicum Palanoc insulae Masbate.

115. *Vitrinoidea quadrasi* Mlldff.

T. interna, discoidea, tenuis, nitens, glabra, corneo-virescens. Anfr. 3¾ rapidissime accrescentes, ultimo antice valde arcuato, medio sat protracto.

Diam. maj. 17,5. min. 12,5. alt. (approx.) 8,5.

Chlamys omnino clausa, tenuis, subtiliter granulosa, irregulariter nigromaculata, tergum pedis sat latum, planiusculum medio sulcatum, latera rugis oblique decurrentibus induta, margo basalis angustissimus, solea distincte tripartita, zona mediana alba, laterales paullo angustiores nigrae. Pes acuminatus.

Long. (spec. conserv.) 35, a testa ad caudam 17 mm.

Hab. ad vicum Baleno insulae Masbate.

116. *Helicarion papillifer* Quadr. et Mlldff.

T. vix rimata, depressa, tenuissima, pellucida, subtilissime plicato-striatula, valde nitens, pallide virescenti-flavida; spira fere plana apice vix prominulo. Anfr. 3¾ celeriter accrescentes, sutura appressa latiuscule marginata discreti, planiusculi, ultimus basi convexus, tumidulus. Apertura sat obliqua, late elliptica, fere circularis, valde excisa, peristoma simplex, acutum, margine columellari superne brevissime reflexo.

Diam. max. 15, alt. 9 mm.

Animal fere unicolor cinereofuscum, glandula caudalis profunda, tergum pedis valde compressum in cornu supra glandulam curvatum desinens, chlamidis appendices testam animalis vivi omnino obtegentes, dexter 4—7, sinister 1—3 papillas validiusculas in margine supero gerentes.

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at

Hab. in monte Bulalacao prope vicum San Agustin insulae Masbate.

117. *Hemitrichia velutinella* Quadr. et Mlldff.

T. globoso-depressa, tenuis, brunneo-castanea; spira sat elevata, convexo-conoidea, fere semiglobosa, apex acutinsculus fulvescens. Anfr. fere 6 convexiusculi, lente accrescentes, sutura impressa sat profunda discreti, lineis spiralibus et striis radialibus valde confertis minute granulati, granulis pilos breves flavidos — circa 64 in 1 □ mm — gerentibus, ultimus infra peripheriam lateraliter subcompressus, regione sculpta a basi laevigata nitida per lineam subelevatam separata, regione umbilicali zona lata lutea cincta. Apertura parum obliqua, transverse ovalis, valde excisa, peristoma simplex acutum, margine columellari calloso, sursum paullum dilatato, reflexo.

Diam. max. 25, alt. 16, apert. lat. 14, long. 10, alt. 9 mm.

Hab. ad vicos Mobo, Palanoc, Kar., Baleno, Magdalena insulae Masbate.

118. *Bensonia (Glyptobensonia) diplotropis* Quadr. et Mlldff.

T. modice umbilicata, umbilico pervio fere cylindrico $^1/_6$ diametri adaequante, depresso-conoidea, aut conoideo-depressa, tenuiscula, subpellucida, radialiter plicato-striata, superne liris elevatis 8, quarum una pone carinam major, sculpta, subopaca, luteo-cornea; spira plus minusve elevata lateribus fere strictis apice plano. Anfr. 6 convexiusculi, sutura profunda, fere canaliculata discreti, ultimus ad peripheriam sat acute carinatus, infra carinam subexcavatus, tum convexior, ad umbilicum declivis, basi lineis spiralibus subtus evanescentibus et striis aliquantulo minoribus sculptus, subnitens. Apertura parum obliqua, subrotundato-securiformis, peristoma rectum, obtusum, margine basali bene

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at

arcuato, calloso-incrassato, columellari sinuoso, haud reflexo.

Diam. 13, alt. 6,5
„ 12, „ 6,5
„ 9,5 „ 5,5

Hab. ad vicos Palanoc, Mobo, Naro et Magdalena insulae Masbate.

119. *Aulacospira triptycha* Quadr. et Mlldff.

T. sat aperte umbilicata, discoidea, tenuis, striis plicaeformibus arcuatis tenuiter sculpta. ? cornea; spira breviter conoidea, subgradata. Anfr. 4½ planulati, ad suturam profundam subsoluti, ultimus ad peripheriam obtuse carinatus, supra carinam leviter impressus, basi subplanus. Apertura fere horizontalis, oblique ovalis, dentibus 3, 1 in pariete, 1 basali et 1 columellari lamelliformi horizontali, coarctata. Peristoma continuum, superne appressum, margine supero recto, externo et basali breviter expansis, columellari reflexiusculo.

Diam. max. 4, alt. 1,75 mm.

Hab. in monte Bathuan prope vicum Palanoc insulae Masbate.

120. *Blauneria quadrasi* Mlldff.

T. sinistrorsa, elongate fusiformis, tenuis, hyalina, laevigata, nitens. Anfr. 8 plani, sutura vix impressa discreti, ultimus spiram subaequans. Apertura elongate guttiformis, peristoma rectum, acutum basi intus labiatum, columella subtus torta, truncato-excisa, plica parvula oblique intuenti conspicua munita. Lamella parietalis valida, spiraliter recedens.

Alt. 5,25, diam. 1,75 mm.

Hab. in insula Masbate.

Cylindrotis Mlldff. n. gen. Auriculidarum.

T. fere cylindrica, apertura angusta, peristoma rectum,

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at

obtusum intus labiatum, lamella parietalis una, columella valde torta, truncata, plicae palatales 2. Typ. C. quadrasi Mlldff.

121. *Cylindrotis quadrasi* Mlldff.

T. dextrorsa, fere cylindrica, decollata, solidula, subtilissime striatula, valde nitens, virescenti- flavida. Anfr. qui supersunt 4 plani, sutura appressa sublacerata discreti, ultimus paullum convexiusculus, basi attenuatus. Apertura perangusta, subauriformis, peristoma rectum, obtusum, margine dextro medio protracto, intus labiato. Columella valde spiraliter torta, basi exciso-truncata, superne plica oblique intuenti conspicua munita. Lamella parietalis modica, subhorizontalis, plicae palatales 2 longe intrantes.

Alt. 10,25, diam. 3 mm.

Hab. in insulis Masbate, Negros et Culion.

122. *Stenothyra decollata* Mlldff.

T. minuta, ovata, solidula, vix striatula, lutea, irregulariter brunneo-taeniata et strigata; spira erosa. Anfractus qui supersunt 2—$2^1/_2$ convexiusculi, ultimus antice paullum applanatus, ad aperturam valde coarctatus. Apertura parum obliqua, oblique ovalis, superne leviter angulata, peristoma subduplex, parum incrassatum.

Alt. 1,5, diam. 1,3 mm.

Hab. ad vicum Bislig insulae Mindanao leg. cl. O. Koch.

123. *Assiminea quadrasi* Mlldff.

T. rimata, turrito-conica, solida, tenuissime striatula, valde nitens, fulvo-cornea, taeniis 2 castaneis parum distinctis ornata; spira valde elevata lateribus vix convexiusculis, apice acuto. Anfr. 7 fere plani, infra suturam submarginatam parum impressam lirula elevata cincti, ultimus ad peripheriam confuse angulatus. Apertura

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at

parum obliqua, oblique acuminato-ovalis, peristoma rectum, obtusum, columella calloso incrassata; peri-omphalum crista validiuscula parum remota cinctum.

Alt. 3,5, diam. 2,3 mm.

Hab. ad vicos Palano c, Mobo et Naro insulae Masbate.

124. *Ditropis pusilla* Quadr. et Mlldff.

T. minuta, modice sed pervie umbilicata, turbinata, tenuis, levissime striatula, nitens, flavescens; spira gradata apice obliquo obtuso. Anfr. 4½ perconvexi, sutura profunda discreti, carinula bene exserta acutula cincti, ultimus carina altera infra peripheriam et tertia circa umbilicum carinatus. Apertura modice obliqua, sub-circularis, peristoma simplex obtusum.

Diam. 2, alt. 1,75 mm.

Hab. prope vicum Baleno insulae Masbate.

125. *Cyclophorus aëtarum* Mlldff.

T. anguste et fere omnino obtecte umbilicata, turbinata, persolida, transverse levissime striatula, carinis 4 bene exsertis cincta, in interstitiis minutissime decussata, nitidula, castanea strigis flammulatis flavidis picta, infra medium taenia lata fusca ornata. Spira modice elevata, fere regulariter conica. Anfr. 5½ convexi, ad suturam vix impressam late applanati, ultimus basi fere laevigatus, unicolor castaneo-fulvus. Apertura subcir[illegible]ris, peristoma haud aut vix expansum, incrassata[illegible], intus valde labiatum, marginibus callo crasso jun[illegible]is, columellari valde dilatato, appendice appresso ur[illegible]licum fere omnino obtegente.

Diam. maj. 47, [illegible]41, apert. lat. (intus) 19, c. perist. 29 mm.

Hab. in montibus altioribus provinciae Morong legi ipse.

126. *Cyclophorus coronensis* Mlldff.

T. anguste et semiobtecte umbilicata, depresse turbinata, solida, transverse striatula, carinulis validiusculis

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at

fortiter exsertis et in interstitiis lirulis spiralibus sculpta, nitidula, flavida strigis fulguratis perlatis castaneis picta. Spira conoidea lateribus fere strictis. Anfr. 5½ convexi, ad suturam parum impressam sat late applanati. Apertura sat obliqua, subcircularis, peristoma distincte duplicatum, sat late expansum, incrassatum, marginibus callo valido junctis.

Diam. 22,5, alt. 20, apert. lat. 13,5, long. 12, alt. 11 mm.

Hab. in insula Coron archipelagi Calamianes dicti leg. coll. indigena.

127. *Lagochilus tumidulum* Quadr. et Mlldff.

T. anguste perforata, conico-globosa, tenuiuscula, subpellucida, carinulis 5 majoribus et in interstitiis liris spiralibus sculpta, pilis brevibus undique hirsuta, fulvida, strigis flammulatis castaneis et ad suturas serie regulari macularum fuscarum picta; spira turbinata, apice acuto. Anfr. 5½ convexi, ultimus tumidus. Apertura modice obliqua, ampla, subcircularis, peristoma parum expansum.

Diam. 14, alt. 13, apert. diam. 7,5 mm. f. major: diam. 19, alt. 16 mm. f. minor: diam. 12,5, alt. 11,75 mm.

Hab. in insulis Negros et Masbate.

128. *Lagochilus eurygomphalum* Mlldff.

T. late et pervie umbilicata, umbilico fere ⅓ diametri adaequante, conoideo-depressa, sat tenuis, subpellucida, striis transversis et lineis spiralibus valde confertis granulatis sculpta, carinulis 5 parum prominentibus cincta, in carinulis setis longiusculis hirsuta, fulva, castaneo-strigata. Spira breviter conoidea, apice acutulo, glabrato. Anfr. 5½ convexi, ad suturam valde impressam subplanati, ultimus antice paullatim descendens. Apertura valde obliqua, subcircularis,

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at

peristoma parum expansum, ad insertionem breviter excisum. Operculum normale.

Diam. 14,5, alt. 9,5 mm.

Hab. prope vicum *Loquilocon* insulae *Samar* leg. coll. indigena.

129. *Lagochilus cagayanicum* Quadr. et Mlldff.

T. perforata, turbinata, solidula, oblique striatula, costulis membranaceis valde deciduis confertis et lineis spiralibus tenuissimis sculpta, pilis brevissimis undique pilosula, ad peripheriam subangulata et 2 series pilorum longiorum gerens, tertia ad suturam et quarta circa umbilicum additis, alternatim fusco- et luteo strigata. Spira subregulariter conica apice acutulo. Anfr. $5^1/_2$ convexi, sutura valde impressa discreti, ultimus vix descendens, ad aperturam campanulatus. Apertura valde obliqua, fere circularis, peristoma duplex, externum sat expansum, interruptum, margine externo ad insertionem breviter recedente, internum continuum, brevissime porrectum, vix expansum, superne adnatum et excisum. Operculum normale.

Diam. 6,5—7,6, alt. 6—7 mm.

Hab. prope vicos *Lallo* et *Buguey* provinciae *Cagayan*.

130. *Lagochilus scalare* Quadr. et Mlldff.

T. modice umbilicata, turbinata, solidula, strigis flammulatis castaneis picta. Spira gradata, apice acutulo. Anfr. $5^1/_2$ angulato convexi, sutura profunda canaliculata discreti, transverse striatuli, carinis 2 bene exsertis et lineis spiralibus confertis sculpti, ultimus basi carinulis elevatis, quarum una circa umbilicum fortior, cinctus, antice breviter descendens. Apertura diagonalis, subcircularis, peristoma vix expansum, incrassatulum, superne leviter excisum.

Diam. 5,25, alt. 5,25 alt. 5,25 mm.

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at

Hab. ad oppidum *Surigao* nec non prope vicum *Jabonga* insulae Mindanao.

131. *Lagochilus polytropis* Quadr. et Mlldff.

T. anguste umbilicata, turrito-turbinata, tenuis, subpellucida, sericina, flavida, strigis latiusculis flammulatis castaneis picta; spira valde elevata, fere regulariter conica apice acuto. Anfr. $6^1/_2$ perconvexi, sutura profunda discreti, carinulis 6 bene exsertis pilos breves valde decidnos gerentibus sculpti, transverse leviter striatuli, ultimus basi carinulis 8—9 usque in umbilicum cinctus. Apertura sat obliqua, subcircularis, peristoma rectum, obtusum, intus calloso-incrassatum, superne breviter excisum.

Diam. 4,5, alt. 5 mm.

Hab. prope vicum Placer insulae Mindanao.

132. *Leptopoma poecilum* Quadr. et Mlldff.

T. anguste perforata, globoso-conica, tenuis, pellucida, subtiliter striatula, lineis spiralibus microscopicis decussatula, liris elevatis 6 supra peripheriam cincta, brunnescens, maculis albis in lineas radiales dispositis picta; spira sat elevata, subregulariter conica, acuta. Anfr. $5^1/_2$ convexi, ad suturam subapplanati, ultimus infra peripheriam subglabratus, nitidulus, circa umbilicum pallescens. Apertura valde obliqua, subcircularis, peristoma angulatim reflexum, patens, igneum, marginibus approximatis, callo tenui junctis, columella sat profunde sinuata, lateraliter sat excisa, cum margine basali angulum subdistinctum fere alaeformem formans.

Diam. max. 11, alt. 11,5 mm.

Hab. prope vicum Baleno insulae Masbate.

133. *Cyclotus (Platyrhaphe) anthopoma* Mlldff.

T. latissime umbilicata, umbilico $^3/_5$ diametri adaequante, discoidea, solidula, transverse striatula, plicis subtilibus

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at

sat distantibus et lineis spiralibus microscopicis sculpta, pallide lutescens; spira plana, apice mucronato, prominulo. Anfr. $4^1/_2$ teretes, ad suturam profundam alboplicosi, ultimus longe et valde deflexus. Apertura diagonalis, subcircularis, peristoma duplex, externum breviter expansum, superne ad insertionem valde recedens, internum continuum, superne excisum. Operculi lamina interna fere plana sulco valde profundo ab externa calcarea separata, externa valde elevata, lamellis floris instar convergentibus munita.

Diam. maj. 16,5, min. 13,5, alt. 8,5 mm.

Hab. in montibus provinciae Morong insulae Luzon legi ipse.

Var. media Mlldff. spira altiore, anfractu ultimo magis deflexo, testa paullo minore.

Hab. in monte Limutan ejusdem provinciae.

Var. minor Mlldff.

Diam. 11,5—13,5, alt. 6—6,5 mm.

Hab. in provinciis Morong et Bulacan.

134. *Cyclotus (Platyrhaphe) anocamptus* Mlldff.

T. latissime et aperte umbilicata, discoidea, solidula, transverse leviter striatula et plicis latiusculis sat distantibus nec non lineis spiralibus tenuissimis maxime confertis sculpta, luteo-brunnea. Spira fere plana, apice oblique mucronatim prominulo. Anfr. 4 teretes, rapide accrescentes, ad suturam profunde impressam pliculosi, ultimus a medio paullatim ascendens, tum valde deflexus et breviter solutus. Apertura diagonalis, circularis, peristoma rectum, acutulum. Operculum terminale, lamina externa valde concava, anfr. 8 marginibus lamellatim prominentibus.

Diam. maj. 14, min. 11,5, alt. 6,5, apert. diam. 6 mm.

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at

Hab. prope vicum Calbayoc insulae Samar leg. coll. indigena.

135. *Porocallia canalifera* Quadr. et Mlldff.

T. oblique ovalis, streptaxidiformis, solidula, laevigata, lubrica, oleo-nitens, carneo-lutescens. Anfr. 5 fere plani, supremi 3 spiram subregularem efficientes, ultimi valde distorti, ultimus ventre applanatus, antice sat ascendens. Apertura parum obliqua, circularis, peristoma rectum, continuum, valde calloso-incrassatum. A columella canalis recurvatus omnino testa obtectus sed pellucens pone aperturam in foramen minutum, apertum desinens.

Long. 5, diam. 4, axis 4.25 mm.

Hab. in insula Catanduanes.

136. *Alycaeus quadrasi* Mlldff.

T. aperte umbilicata, subconoideo-depressa, solidula, costulis valde confertis et lineis spiralibus microscopicis sculpta, pallide lutescens aut rarius rubella; spira valde depressa apice obliquo, glabrato, mammillari. Anfr. 4 convexi, ultimus subcompressus, a medio valde tumidus, circa 2 mm. pone aperturam sat constrictus, tum demo tumidulus, valde deflexus, campanulatus, sculptura evanescente. Tubulus suturalis valde productus, ca. 2 mm. longus. Apertura maxime obliqua, fere horizontalis, subcircularis, peristoma duplex, internum continuum, paullum expansum, superne subexciso-sinuatum, externum late expansum, superne ad insertionem attenuatum et recedens, ad umbilicum abrupte truncatum. Operculum cartilagineum, extus sat concavum, intus papilla centrali valida munitum, circa papillam excavatum.

Diam. max. 6.25, alt. 3.8 mm.

Hab. prope vicum Buguey provinciae Cagayan.

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at

137. *Helicomorpha globulus* Quadr. et Mlldff.

T. modice sed pervie umbilicata, conoideo-globosa, tenuis, valde confertim costulata, sericina, albida; spira globoso-conoidea, apice subobliquo, obtuso. Anfr. 4 valde convexi, sutura profunda discreti, ultimus quarta parte ab apertura levissime constrictus, tum subcampanulatus. Apertura parum obliqua circularis, peristoma duplex, externum brevissime expansum, internum valde porrectum, superne subsolutum.

Diam. 1,25, alt. 1 mm.

Hab. in insula Busuanga.

138. *Arinia calathiscus* Quadr. et Mlldff.

T. rimata, subcylindracea, tenuis, subpellucida, fulvoflava; spira fere cylindrica, superne fere plana apice obliquo vix prominulo. Anfr. 5 turgidi, sutura valde impressa disjuncti, primi 3 costulis acutis sat distantibus sculpti, penultimus costulato-striatus, ultimus laevigatus, paullum devians. Apertura verticalis, circularis, peristoma distincte duplex, internum vix expansum, valde porrectum, externum latiuscule expansum, patens.

Alt. 3,25, diam. 2 mm.

Hab. prope vicum Guilhungua insulae Negros (Quadr. No. 3106).

139. *Arinia (Leucarinia) contracta* Quadr. et Mlldff.

T. aperte perforata, ovato-conica, solidula, costulis filiformibus sat distantibus sculpta, albescens. Anfr. 5 perconvexi, superi spiram convexo-conoideam apice obliquo obtusulo efficientes, penultimus sat prominens, ultimus valde devians, antice longe ascendens. Apertura retrorsum inclinata, rotundato-rhomboidea, peristoma duplex: externum sat late expansum, interruptum, internum continuum, superne callo lato crassiusculo

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at

sursum protracto appressum, ad angulum superiorem et ad columellam profundiuscule sinuatum.

Alt. 1.5, diam. 1.25 mm.

Hab. prope oppidum Surigao insulae Mindanao.

140. *Palaina catanduanica* Quadr. et Mlldff.

T. sinistrorsa, vix rimata, fere cylindrica, tenuis, pellucida, sat confertim costulata, albida; spira superne breviter conoidea apice obtuso. Anfr. 6 convexi, ultimus penultimo haud angustior, paullum devians, antice breviter ascendens. Apert. verticalis, circularis, peristoma duplex, externum ab interno sulco profundiusculo separatum, utrumque expansum, patens.

Alt. 1.5, diam. 0.75 mm.

Hab. in insula Catanduanes.

141. *Palaina deformis* Quadr. et Mlldff.

T. sinistrorsa, anguste perforata, oblongo- globosa, tenuis, subpellucida, costulis elevatis sat distantibus sculpta, albida. Anfr. $5^1/_2$ convexi, supremi 3 spiram fere planam apice obliquo glabrato mammillatim prominente efficientes, quartus paullum ascendens, tum valde deflexus, devians, ultimi angustiores, valde deviantes, ultimus valde ascendens penultimum fere obtegens. Apertura retrorsum inclinata, subcircularis, peristoma duplex, externum sat expansum, interruptum, internum valde porrectum, tum expansum, superne callo lato appressum.

Alt. 1.6, diam. 1.25 mm.

Hab. in insula Catanduanes.

142. *Diplommatina masbatica* Quadr. et Mlldff.

T. vix rimata, graciliter conico- turrita, tenuis, corneo-fulva, costulis tenuissimis valde distantibus — 15 in anfractu ultimo — sculpta; spira valde elongata, fere regulariter conica. Anfr. 8 convexi, ultimus paullum

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at

decrescens, vix distortus, brevissime ascendens. Apertura parum obliqua, sat parva, subauriformis, peristoma subduplex, sat late expansum. Lamella columellaris parva, subauriformis, peristoma subduplex, sat late expansum. Lamella columellaris parva, obliqua.

Hab. in monte Batuhan prope vicum Palanoc insulae Masbate.

143. *Diplommatina goniocampta* Quadr. et Mlldff.

T. non rimata, oblonga, gracilis, tenuis, pellucida, confertim costulata, albida: spira turrita lateribus paullum concavis, apice acutulo. Anfr. 7½ perconvexi, ad peripheriam subangulati, penultimus lateraliter prominens, ultimus parum devians, antice brevissime ascendens. Apertura paullum obliqua, subcircularis, peristoma duplex, externum breviter expansum, interruptum, internum longe porrectum, denique expansiusculum, superne callo sat lato appressum. Lamella columellaris humilis.

Alt. 1,9, diam. 0,8 mm.

Hab. prope oppidum Surigao insulae Mindanao (Quadr. No. 2719).

144. *Diplommatina elegantissima* Quadr. et Mlldff.

T. rimata, graciliter turrita, tenuis, pellucida, costulis tenuibus sigmoideis valde distantibus (verosimiliter in alas productis) sculpta, hyalina; spira gracilis, valde elongata apice obtusulo. Anfr. 7½ perconvexi, fere angulati, ultimus initio modice constrictus, tum tumidulus, parum devians, brevissime ascendens. Apertura sat obliqua, rotundato-tetragona, peristoma duplex, externum late expansum, internum breviter porrectum. Lamella columellaris humilis obliqua.

Alt. 2,6, diam. 1,2 mm.

Hab. prope vicum *Canóan* insulae Siquijor.

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at

145. *Diplommatina (Sinica) mindanaoica* Quadr. et Mlldff.

T. rimata, conico-turrita, tenuis, subpellucida, corneo-fulva, costulis valde obliquis, valde distantibus sculpta. Anfr. 7 convexi, ultimus parum devians, antice brevissime ascendens. Apertura modice obliqua, oblique ovalis, peristoma late expansum, duplex, internum subporrectum. Lamella columellaris valde humilis, palatalis brevis, horizontalis.

Long. 2.5, diam. 1.25 mm.

Hab. prope oppidum Surigao insulae Mindanao.

146. *Diplommatina (Sinica) diploloma* Quadr. et Mlldff.

T. vix rimata oblonge ovato-conica, solidula, subpellucida, pallide flavescens, costulis filiformibus valde distantibus sculpta; spira sat elevata, fere regulariter conica, apice obliquo glabrato obtusulo. Anfr. 7 convexi, ultimus paullum distortus, antice breviter ascendens. Apertura paullum obliqua, oblique ovalis, peristoma duplex, externum late expansum, internum valde incrassatum et porrectum, denique breviter expansum, superne callo lato crassiusculo appressum. Lamella columellaris humilis, palatalis longa, supra columellam conspicua.

Alt. 2.5, diam. 1.2 mm.

Hab. prope oppidum Surigao insulae Mindanao (Quadr. No. 2717).

147. *Diplommatina (Sinica) cyrtochilus* Quadr. et Mlldff.

T. subrimata, elongate ovato-conica, solidula, confertim costulata, corneo-flavescens. Anfr. 7 perconvexi, antepenultimus maximus, penultimus paullum, ultimus valde distortus, antice sat ascendens. Apertura fere verticalis, irregulariter auriformis, peristoma sat expansum, valde incrassatum, quasi multiplicatum, margo externus sinuosus, superne protractus, callo tuberculi-

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at

formi munitus. Lamella columellaris sat valida, palatalis modica, parietalis validiuscula remota.

Alt. 2,25, diam. 1 mm.

Hab. in insula Busuanga.

Paradiancta Mlldff. n. sect. Dianctae v. Mart.

T. dextrorsa, anfr. penultimus fere initio constrictus, lamella palatali longiuscula munitus, columella lamella longe intrante armata. Typ. Diancta philippinica Quadr. et Mlldff.

Hab. Ins. Philippinae et Borneo (D. everetti et irregularis E. Sm.).

148. *Diancta (Paradiancta) philippinica* Quadr. et Mlldff.

T. dextrorsa, rimata, irregulariter turrito-oblonga, tenuis, pellucida, costulis tenuibus filiformibus sat distantibus sculpta, nitens, hyalina. Anfr. 8 convexi, primi 6 spiram elatam, subregulariter conicam formantes, penultimus fere initio constrictus, decrescens, valde devians, ultimus amplior, fere tumidulus, ascendens. Apertura sat obliqua, rotundato-rhomboidea, peristoma duplex, externum paullum expansum, reflexiusculum, internum valde incrassatum, callo lato appressum. Lamella columellaris valida, sat alta, subhorizontalis, palatalis sat longa, in anfractu penultimo pone strictiram perlucens.

Alt. 2,5, diam. vix 1 mm.

Hab. in insula Siquijor.

149. *Georissa coccinea* Quadr. et Mlldff.

T. imperforata, globoso-conica, solida, laevigata, nitidula, coccinea; spira modice elevata lateribus convexiusculis. Anfr. 4 sat convexi, ultimus antice levissime descendens. Apertura valde obliqua, ovalis, peristoma rectum, obtusum, margo columellaris valde dilatatus, incrassatus, calloso-reflexus.

Alt. 1,75, diam. 1,5 mm.

Hab. ad vicum Palanoc insulae Masbate.